



UMIKO[®]

ACIDI UMICI E ACIDI FULVICI ESTRATTI DA LEONARDITE



SDS



UMIKO®

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - Attivatore ESTRATTI UMICI DA LEONARDITE

Composizione:

Sostanza organica sul tal quale 18 %

In percentuale di peso sulla sostanza secca:

Sostanza organica 100 %

Sostanza organica umificata in percentuale della sostanza organica 80 %

N azoto (N) organico 1,7 %

Rapporto C/N 30

Mezzo estraente: idrossido di potassio (KOH)

Caratteristiche:

UMIKO è un prodotto liquido ad elevato contenuto di sostanze umiche.

- **Migliora le proprietà fisiche, chimiche e biologiche di tutti i terreni**
- **Aumenta e stimola la radicazione e migliora l'assorbimento degli elementi nutritivi**
- **Aiuta lo sviluppo dei batteri del suolo e migliora le produzioni in termini quantitativi e qualitativi di tutti i tipi di colture**

Indicazioni di pericolo

H315: Provoca irritazione cutanea.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/
gli aerosol.

P273: Non disperdere nell'ambiente.

P280: Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.

P321: Trattamento specifico (vedere le istruzioni supplementari di primo soccorso su questa etichetta)

P362+P364: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P501: Smaltire il contenuto o il contenitore presso un punto di raccolta per rifiuti speciali o pericolosi, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/ o internazionali.

Numero telefonico di emergenza: +49 (0) 6132-84463

UFI: DWV0-D0KX-F000-TX15

Contiene: 2-ottil-2H-isotiazol-3-one



ATTENZIONE

Dosi e modalità d'impiego:

Colture	Epoca applicazione	Fertirr.
Frutticoltura	da ripresa vegetativa ad invaiatura	10-20 kg/ha
Viticultura	da ripresa vegetativa ad invaiatura	10-20 kg/ha
Orticoltura serra	da accrescimento a fine produzione	10-20 kg/ha
Orticoltura campo	da accrescimento a fine produzione	10-20 kg/ha
Fragola	da ripresa vegetativa a fine produzione	10-20 kg/ha
Floricole	in produzione	10 kg/ha

Dosaggi e numero interventi devono essere modulati in funzione alle esigenze della coltura. Si consiglia sempre di effettuare test per verificare la massima compatibilità.

Avvertenze:

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 5 e 35 °C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/ o sabbia. Per ogni singolo trattamento si consiglia di non superare i dosaggi in etichetta. Per dosaggi specifici si consiglia di rivol - gersi al tecnico.

Fabbricante:

COMPO EXPERT Italia srl

Via Marconato, 8 20822

Cesano Maderno (MB)

Distributore:



C.R.A. srl

Via Prov. Cotignola, 22/2

48022 Lugo (RA)

Tanica Plastica HDPE 2

Tappo Plastica HDPE 2

Raccolta differenziata Verificare la disponibilità del comune

PESO NETTO 21,9 KG